

Krebsregister
Baden-Württemberg




² Klinische Landesregisterstelle (KLR-GmbH) des Krebsregisters Baden-Württemberg, Stuttgart

- **Datenquelle:** Krebsregister Baden-Württemberg
- **Diagnosejahre:** 2004–2025
- **ICD-10:** C44, C51, C63.2
- **Histologische Subgruppen der Karzinome:** Schweißdrüse (8400/3, 8407/3), Talgdrüse (8410/3), Haarfollikel (8100/3, 8110/3), Sonstige Adnexkarzinome (8390/3, 8200/3)
- **Gesamtüberleben:** Kaplan-Meier-Analyse
- **Prognosefaktoren:** multivariable Cox-Regression
- **Adjustierung:** Alter, Geschlecht, Tumorlokalisation, T-Stadium
- **Sensitivitätsanalyse:** Ausschluss von Patient:innen >80 Jahre

	Gesamt	Haarfollikel	Schweißdrüse	Talgdrüse	Sonstige	p-Wert
Alter Median	435 75.00 [63.50, 83.00]	18 78.50 [71.25, 83.00]	99 70.00 [60.50, 79.00]	219 79.00 [67.50, 85.00]	99 71.00 [60.00, 79.50]	<0.001
Altersgruppen						<0.001
18-54 J	62 (14.3)	3 (16.7)	18 (18.2)	20 (9.1)	21 (21.2)	
55-79 J	213 (49.0)	8 (44.4)	58 (58.6)	94 (42.9)	53 (53.5)	
>80 J	160 (36.8)	7 (38.9)	23 (23.2)	105 (47.9)	25 (25.3)	
Geschlecht						<0.001
Männlich	243 (55.9)	7 (38.9)	44 (44.4)	144 (65.8)	48 (48.5)	
Weiblich	192 (44.1)	11 (61.1)	55 (55.6)	75 (34.2)	51 (51.5)	
Lokalisation						0.039
Haut	124 (28.5)	7 (38.9)	30 (30.3)	50 (22.8)	37 (37.4)	
Kopf-Hals	311 (71.5)	11 (61.1)	69 (69.7)	169 (77.2)	62 (62.6)	
T-Angabe						0.085
T1 / T2	227 (90.1)	8 (80.0)	46 (85.2)	141 (94.0)	32 (84.2)	
T3 / T4	25 (9.9)	2 (20.0)	8 (14.8)	9 (6.0)	6 (15.8)	
Therapie						0.001
OP	248 (86.4)	9 (100.0)	50 (86.2)	154 (91.7)	35 (67.3)	
OP + adjuvante Therapie	25 (8.7)	0 (0.0)	4 (6.9)	11 (6.5)	10 (19.2)	
ST / SY	14 (4.9)	0 (0.0)	4 (6.9)	3 (1.8)	7 (13.5)	

- **435 Patient:innen** eingeschlossen (56 % männlich)
- **Die größte Subgruppe:** Talgdrüsenkarzinome
Höheres Erkrankungsalter bei Talgdrüsen- und Haarfollikelkarzinomen (Median: 79 Jahre)
- **Häufigste Tumorlokalisation:** Kopf-Hals-Region
- **Therapie:**
 - Talgdrüsen- und Haarfollikelkarzinome: meist operativ
 - andere Subtypen häufiger mittels Strahlen- oder Systemtherapie

- **5-Jahres-Gesamtüberleben:** 65 %
- **Schlechteres Gesamtüberleben:** beim Talgdrüsen- vs. Schweißdrüsenkarzinom
- **Unabhängiger Risikofaktor:** höheres Alter
- **Besseres Gesamtüberleben:** weibliches Geschlecht und Kopf-Hals-Lokalisation



- Alter bleibt prognostisch relevant.
- Der Einfluss des Subtyps verliert seine Signifikanz
- Weibliches Geschlecht ist mit besserem Gesamtüberleben assoziiert.
- Die Ergebnisse sprechen für einen alters- und geschlechtsbedingten Einfluss auf die beobachteten Überlebensunterschiede

- Das Gesamtüberleben wird primär durch das Alter bestimmt.
- Weibliches Geschlecht ist ein unabhängiger Prognosefaktor.
- Der prognostische Nachteil des Talgdrüsenkarzinoms verliert nach Ausschluss der >80-jährigen seine Signifikanz.

Interessenkonflikt: Es liegen keine Interessenkonflikte vor.